

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

**Tên luận án:** “Ảnh hưởng của giới tính, thời điểm cho ăn sau nở và chế độ dinh dưỡng đầu đời đến khả năng sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch ở gà thịt”

**Chuyên ngành:** Chăn nuôi                      **Mã số:** 9.62.01.05

**Nghiên cứu sinh:** Bùi Thị Kim Phụng


**Người hướng dẫn:** PGS.TS. Chế Minh Tùng

**Cơ sở đào tạo:** Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

**Những đóng góp mới của luận án:** Xác định được thời điểm cho gà thịt Lương Phượng ăn ngay sau nở khi nuôi riêng trống mái sẽ cho kết quả tốt về khả năng sinh trưởng, sử dụng thức ăn, tỷ lệ nuôi sống, tỷ lệ đồng đều của đàn, các chỉ tiêu về tỷ lệ các nội quan lúc gà 7 ngày tuổi và lúc xuất chuồng 56 ngày tuổi so với thời điểm truyền thống cho gà ăn trễ sau khi gà về đến trại được 4 - 8 giờ hoặc cho gà ăn lúc 30 giờ sau khi nở.

Chứng minh được thức ăn khởi đầu Vistart với thành phần nguyên liệu dễ tiêu hóa, đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho gà ăn sau khi nở đến 7 ngày tuổi để cải thiện phần lớn các chỉ tiêu sản xuất của gà Lương Phượng lúc 7 ngày tuổi.

**Người hướng dẫn khoa học**



PGS.TS. Chế Minh Tùng

**Nghiên cứu sinh**



Bùi Thị Kim Phụng

## NEW CONTRIBUTION OF THE STUDY

**Thesis title:** “Effect of sex, post-hatch feeding time and pre-starter feeds on growth performance and immune responses of broilers.”

**Major:** Animal Science                      Code: 9.62.01.05

**Ph.D. Candidate:** Bui Thi Kim Phung

**Supervisors:** Assoc. Prof. Dr. Che Minh Tung


**Educational institution:** Nong Lam University, Ho Chi Minh City

### **New findings of the thesis:**

The study has indicated that feeding Luong Phuong broiler chickens immediately after hatching when raising male and female chickens separately will give optimum results in terms of growth performance, feed utilization, survival rate, flock uniformity and relative organ weights at 7 and 56 days old compared with the traditional time of feeding chickens at 4 - 8 hours after chicks' arrival at the farm or feeding chicks at 30 hours after hatching.

The study has proven that the Vistart pre-starter diet with highly digestible ingredients and adequate nutrition can be used for feeding chicks from hatching up to 7 days of age to improve most of the production parameters of Luong Phuong chicks at 7 days old.

**Supervisors**



Assoc. Prof. Dr. Che Minh Tung

**Ph.D. Candidate**



Bui Thi Kim Phung